



Yarden™ 50 SL

Características del extracto de la planta *Urtica*:

Urtica spp. extracto acuoso de ortiga al 5% (*Urtica dioica* y *Urtica urens*)

Urtica spp. El extracto de plantas tiene una amplia gama de ventajas agrícolas y se utiliza como insecticida, fungicida y nematicida. Además de sus cualidades para el control de plagas, *Urtica* es un anfitrión para los beneficios y se puede utilizar como fuente nutricional y bioestimulador, mejorando así el bienestar general de los cultivos tratados.



Urtica spp.

Yarden™ 50 SL es un insecticida altamente activo derivado de plantas, para usar en una amplia gama de cultivos.

- A base de un extracto vegetal natural de la planta herbácea *Urtica* sp., conocida por sus beneficios medicinales, culinarios y agrícolas.
- Yarden™ 50 SL es un insecticida amigable con el medio ambiente y de baja toxicidad para humanos, animales, flora y fauna.
- **Yarden™ 50 SL** ofrece excelentes resultados de protección de cultivos mientras mantiene un nivel residual bajo en cultivos comestibles.
- Un excelente producto de cumplimiento del programa IPM.
- ¡Sustancia aprobada por la UE!

Características de Yarden™ 50 SL

- Altamente efectivo mientras se basa en un ingrediente natural.
- Actividad de amplio espectro contra insectos de cuerpo blando y ácaros
- Disminuye la cantidad de activos sintéticos en el campo
- Riesgo de resistencia cruzada reducido
- Bajo impacto ambiental

Instrucciones de uso

Yarden™ 50 SL debe mezclarse con agua para estar listo para su uso y puede aplicarse con cualquier tipo de equipo rociador. Siempre use la mezcla para rociar el día de la preparación y no ingrese al área tratada hasta que la mezcla para rociar se haya secado.

Asegure una cobertura completa del dosel de la planta con la mezcla de pulverización para lograr la máxima eficacia.

Alterne siempre con insecticidas de diferente modo de acción a lo largo de la temporada.



Nota IMPORTANTE:

Los cultivos indicados en esta hoja informativa del Producto pueden no ser aplicables en el país donde se pretende utilizar el producto. El usuario debe referirse y usar el producto sólo según el registro oficial en el país de uso y los usos y tarifas aprobados por las autoridades autorizadas. El proveedor no será responsable si el producto se utiliza en cultivos que no figuran en la etiqueta oficial aprobada por el ministerio de agricultura del país de uso.

Descargo de responsabilidad: esta información y todos los demás consejos técnicos se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales y en las aprobaciones de las autoridades de registro. Sin embargo, no implica ninguna obligación u otra responsabilidad legal de nuestra parte, incluso con respecto a los derechos de propiedad intelectual de terceros existentes, especialmente los derechos de patente. En particular, no se pretende ni implica ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, o garantía de las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios de acuerdo con el progreso tecnológico o desarrollos posteriores. En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento o cualquier otra fuente de información y la información contenida en la etiqueta del producto, prevalecerá la información contenida en la etiqueta del producto. El cliente/usuario no queda exento de la obligación de realizar una cuidadosa inspección y prueba de los productos. El rendimiento del producto descrito en este documento debe verificarse mediante pruebas, que deben ser realizadas únicamente por expertos calificados bajo la exclusiva responsabilidad del cliente. La referencia al uso de nombres comerciales por parte de otras empresas no es una recomendación ni implica que no se puedan utilizar productos similares.

Rango de aplicación

Yarden™ 50 SL es activo contra insectos de cuerpo blando, incluidos, entre otros, los siguientes:

Cultivo	Parásito	Rango de aplicación
Vegetales	Pulgones, moscas blancas, arañas rojas, lepidópteros	2-4 L/Ha
Frijoles, Guisantes, Soya, Cacahuete		
Cebollas, Ajo		
Ornamentales		

Notas de aplicación:

- Rocíe Yarden™ 50 SL de manera preventiva o en las primeras etapas del desarrollo de la plaga.
- Repita el tratamiento a intervalos de 7 a 10 días según sea necesario.
- Demore la fumigación si se espera lluvia dentro de las próximas horas o bajo condiciones que favorezcan la escorrentía o la erosión del suelo por el viento en áreas no objetivo.

Yarden™ 50 SL el campo

Ubicación:

España, 2021

Número de aplicaciones:

2 @ intervalo de 9 días

Cultivo:

Repollo

Plagas objetivo:

pulgones y moscas blancas

